

Os passos da Inflamação Dor de Garganta

1 TRANSMISSÃO

MAIOR PARTE
TÊM **ORIGEM VIRAL**

2 INFECÇÃO

PODE OCORRER EM **DIFERENTES PARTES**
DO TRATO RESPIRATÓRIO

3 ORGANISMO REAGE

CASCATA INFLAMATÓRIA

4 INFLAMAÇÃO DA GARGANTA

ORIGINA **EDEMA, VERMELHIDÃO E DOR**



Dolorosa

Incômoda

Irritante

A MINHA DOR DE GARGANTA É...



A SOLUÇÃO TEM QUE TER...

Segura

Eficaz

Rápida

Ação Anti-inflamatória : reduz o edema e vermelhidão

Ação Antissética: elimina os microorganismos responsáveis
pelas infecções

Ação Analgésica : dessensibiliza os tecidos inflamados

Ação Anestésica: alivia a dor e sintomas associados



DOR DE GARGANTA?



NUNCA UMA PASTILHA FEZ TANTUM.



A solução... +Completa

AS PASTILHAS COM AÇÃO FARMACOLÓGICA + COMPLETA (1-3)

SABIA QUE...

A Benzidamina é uma molécula anti-inflamatória não esteroide com propriedades anestésicas e analgésicas.

Foi sintetizada pela primeira vez em 1967 nos Laboratórios Angelini.

Atualmente esta molécula é comercializada em mais de 70 países e largamente utilizada na prática clínica.

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA	X	X	X	
AÇÃO ANALGÉSICA	X	X	X	
AÇÃO ANESTÉSICA	X		X	
AÇÃO ANTISSÉTICA	X		X	X
AÇÃO BACTERICIDA			X	
	TANTUM VERDE Benzidamina	PASTILHAS com Flurbiprofeno	PASTILHAS com Tirotricina Cloreto de Cetilpiridínio Cloreto de Oxibuprocaina	PASTILHAS com Álcool Diclorobenzílico Amilmetacresol


AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTISSÉTICA REFORÇADA (4)

A estrutura química da **Benzidamina** é diferente da dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).

A Benzidamina é um forte inibidor de citocinas pró-inflamatórias e um **fraco inibidor da síntese de prostaglandinas**.

A Benzidamina inibe com eficácia um **amplo espectro de microrganismos** sendo ainda mais eficaz na inibição dos microrganismos da cavidade orofaríngea.

PORQUÊ BENZIDAMINA?



Uma solução... +Eficaz


EFICÁCIA E RAPIDEZ COMPROVADAS

Uma solução... +Rápida




EFICÁCIA COMPROVADA NO TRATAMENTO DAS DORES DE GARGANTA (5)

% Administrações que resultaram em alívio da dor de garganta moderado ou excelente



RAPIDEZ NO TRATAMENTO DAS DORES DE GARGANTA (5)

% Administrações que nos primeiros 10 mn resultaram em alívio da dor de garganta moderado ou excelente



Uma solução... +Versátil



DOR MODERADA A INTENSA

0% SEMAÇUCAR

VARIEDADE DE SABORES



DOR MUITO INTENSA

AÇÃO ANESTÉSICA REFORÇADA

SABOR AGRADÁVEL

EMBALAGEM PRÁTICA



AÇÃO DIRETA

SABOR SUAVE

pediátrica

O CUIDADO COMPLETO PARA A DOR DE GARGANTA DE TODA A FAMÍLIA.

- (1) Guimarães F., Moura D., Silva P.S., Terapêutica Medicamentosa e Suas Bases Farmacológicas, 4ª edição, 2001
- (2) CheBI, Chemical Entities of Biological Interest, EMBL-EBI, 2015
- (3) Toxnet, Toxicologydata Network, NIH, US NationalLibraryofMedicine, 2020. Disponível em:
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/12555#section=Drug-and-Medication-Information>
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3394>
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/452550#section=Pharmacology-and-Biochemistry>
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/31239>
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4633>
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/91737025>
<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14759>
- (4) Escribano-Patón OE, Vol. 8, No.3, 2003. 287-292.
- (5) Wethington J.F., Benzylamine HCl in the treatment of sore throat (gargle), study number: 425U, ver: 1.0, 1976

Tantum Verde 3 mg + 2,5 mg pastilhas

Cada pastilha contém 3 mg de cloridrato de benzidamina e 2,5 mg de benzocaína. Cada pastilha contém igualmente 1,33 g de açúcar em pó (excipiente com efeito conhecido). **Indicações terapêuticas:** Tantum Verde pastilhas está indicado em adultos e crianças com mais de 6 anos para o tratamento sintomático local no alívio da dor e irritação da boca e garganta. **Posologia e modo de administração:** Adultos e crianças com mais de 6 anos: Uma pastilha 3 vezes ao dia. O tratamento não deve exceder os 7 dias. Crianças de 6-11 anos: O produto deve ser administrado sob supervisão de um adulto. Crianças de idade inferior a 6 anos: Devido ao tipo de forma farmacêutica a administração deve ser restrita a crianças com mais de 6 anos de idade. Uso orofaríngeo. As pastilhas devem ser dissolvidas lentamente na boca. Não engolir. Não mastigar. **Contraindicações:** Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. **Advertências e precauções especiais de utilização:** Não aconselhável em doentes com hipersensibilidade ao ácido salicílico e/ou outros AINEs. A utilização prolongada, pode causar sensibilização. Pode desenvolver-se broncospasma em doentes com asma brônquica instalada ou com história anterior. Recomenda-se precaução nestes doentes. Este medicamento contém açúcar. Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, por exemplo galactosemia, malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento. **Efeitos indesejáveis:** Doenças do sistema imunitário- Desconhecidos: Reações anafiláticas, reações de hipersensibilidade. Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino-Muito raros: Laringospasmo. Doenças gastrointestinais- Raros: Sensação de ardor oral, xerostomia. Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos- Pouco frequentes: Fotossensibilidade; Muito raros: Angioedema. Número de Registo 9527101- 20 pastilhas Para mais informações deverá contactar o Titular da AIM: Angelini Farmacêutica, Lda. R. João Chagas, nº 53- Piso 3. 1499-040 Cruz Quebrada-Dafundo. MNSRM – Não compartilhado TTVP- 02

Tantum Verde, 3 mg, pastilhas, sabor a laranja-mel

Tantum Verde, 3 mg, pastilhas, sabor a limão

Tantum Verde, 3 mg, pastilhas, sabor a menta

Cada pastilha contém 3 mg de Cloridrato de benzidamina: (equivalente a 2,68 mg de benzidamina). Excipiente(s) com efeito conhecido: cada pastilha com sabor a laranja-mel contém 3073,53 mg de Isomalte (E 953) e 0,017 mg de Amarelo-sol FCF (E110).

Cada pastilha com sabor a limão contém 3183 mg de Isomalte (E953) e 3,26 mg de Aspartamo (E951). Cada pastilha com sabor a menta contém 3183 mg de Isomalte (E953) e 3,5 mg de Aspartamo (E951). **Indicações terapêuticas:** em adultos e crianças com mais de 6 anos para o tratamento sintomático local no alívio da dor e irritação da boca e garganta. **Posologia e modo de administração:** Adultos e crianças com mais de 6 anos: Uma pastilha 3 vezes ao dia. O tratamento não deve exceder os 7 dias. Crianças de 6-11 anos: O medicamento deve ser administrado sob a supervisão de um adulto. Crianças de idade inferior a 6 anos: Devido ao tipo de forma farmacêutica a administração deve ser restrita a crianças com mais de 6 anos de idade. Uso orofaríngeo. As pastilhas devem ser dissolvidas lentamente na boca. Não engolir. Não mastigar. **Contraindicações:** Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. **Advertências e precauções especiais de utilização:** O uso de benzidamina não é recomendado em doentes com hipersensibilidade ao ácido salicílico ou outros AINE's. Pode desencadear-se broncospasma em doentes com asma brônquica ou com história prévia. Recomenda-se precaução nestes doentes. Num pequeno número de doentes, as ulcerações buco-faríngeas, podem ser causadas por patologias graves. Os doentes cujos sintomas piorem ou que não apresentem qualquer melhoria ao fim de 3 dias, ou que desenvolvam febre ou tenham outros sintomas, devem aconselhar-se junto do seu médico ou dentista conforme apropriado. Todas as pastilhas contém isomalte, doentes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento. As pastilhas com sabor a laranja-mel contém ainda Amarelo-sol FCF (E110) que pode causar reações alérgicas. As pastilhas com sabor a limão e com sabor a menta contém ainda aspartamo, uma fonte de fenilalanina, podendo ser prejudicial em indivíduos com fenilcetonúria. **Efeitos indesejáveis:** Doenças do sistema imunitário- Desconhecidos: Reações anafiláticas, Reações de hipersensibilidade. Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino- Muito raros: Laringospasmo. Doenças gastrointestinais- Raros: Sensação de ardor oral, Xerostomia; Desconhecidos: Hipoestesia oral. Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos - Pouco frequentes: Fotossensibilidade; Muito raros: Angioedema. Nº de registo: 5328950 - 20 pastilhas, sabor laranja-mel; 5094180 – 20 pastilhas, sabor a limão; 3576287 – 20 pastilhas, sabor a menta. Para mais informações deverá contactar o Titular da AIM: Angelini Farmacêutica, Lda Rua João Chagas, 53 – Piso 3. 1499-040 Cruz Quebrada-Dafundo. Portugal TTVPc-03